

セロクエル[®]を服用される患者様とご家族へ

セロクエルを服用されるときは、次のことにご注意ください
ご家族に糖尿病の方がいる患者様、糖尿病になるリスク（血糖値が高い、肥満傾向など）がある患者様は、とくにご注意ください。

このお薬は…

脳の中の神経伝達物質の受容体に作用し、統合失調症の症状をやわらげるお薬です。

- 1 このお薬を服用することにより、血糖値の上昇や体重増加がみられることがあります。血糖値の変化を見るため、服用されている間は定期的に血糖値の測定を行う場合があります。主治医とご相談ください。
- 2 服用中に、



- 激しいのどの乾き
- 水、お茶、清涼飲料水などをたくさん飲む



- おしっこの量が多くなる
- 何回もトイレに行く

などの症状があらわれることがあります。このような症状に気づいたときは、すぐに主治医または薬剤師にご相談ください。

■ その他に服用する上での注意点は?

- 毎日服用し続けることが大切です。ご自身の判断で飲むのを止めたり減らしたりせずに、医師の指示通りに、コップ一杯の水またはぬるま湯で服用してください。
- この薬は眠気や立ちくらみ、めまいなどが現れたりすることがあります。自動車の運転など危険を伴う機械の操作は行わないでください。
- 飲酒により薬の作用が強くあらわれることがありますので、服用中の飲酒はおひかえください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。
- 他に気になることや症状に変化がみられたときは医師または薬剤師にご相談ください。

病院

電話 ()

薬局

電話 ()

保険センター

電話 ()

保健所

電話 ()

精神保健福祉センター

電話 ()

福祉事務所

電話 ()

その他

電話 ()



LTLファーマ株式会社